



Pinot noir productif 91

Vass2R06s126-130  
193Mtp77



\*193MTP77\*

 **INRA**  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

*2 R 6 s 126-130  
Pinot noir productif 91  
de planche 1454*

FH

*Pinot noir productif  
2 R 6 s 126-130*
















Désignation : Pinot noir productif 91

Clos 10 Planche 11 Rang 51 Souche

Vigueur : 1/2

Date de Véraison : 7.8.63

Date de Maturité : 26.8.63

Pourriture : 2 + 2

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - C. 10

BAIE : TG - G - (M) - P. 16.14

Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 11 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 22 disc - sph - (ell) - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 30

s 40 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré.

Désignation : Pinot noir productif 91

Clos 10 Planche 11 Rang S Souche 1

Vigueur : 2

Date de Véraison : le 21.7.64

Date de Maturité : 11.8.64 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C).

Péduncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 14x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 18 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 25 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 32 Obov. - cyl. - fus.

s 46

s 5 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Pinot noir productif 91

Clos 10 planche 11 Rang 5 Souche 1

Vigueur : 3

Date de véraison : 31.7.65

Date de maturité : 18.8.65 0

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M - (P) - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N)

Charge

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 13 dis. - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 24

avec pépins - apyrène

s 33

s 48 jus : inc. - coloré

s 5

reacuncule : L - M - (C)



Année : 1963

Emplacement ... 10. 11. 5. 1 ..... Désignation Pinot noir productif 91

|   |              | D A T E S |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
|   | Nombre total |           |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | 28.3      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3            | 2.        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4            | 3.        |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | faible       |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |              |           |  |  |  |  |  |  |  |

D 6 26-3-63a

-10

Année : 1964

Emplacement ... 10. 11. 5. 1 ..... Désignation Pinot noir productif 91

|   |              | D A T E S |    |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|
|   | Nombre total |           |    |  |  |  |  |  |  |
|   |              | 14        | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5            | 2         | 4  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | faible       |           |    |  |  |  |  |  |  |
| 3 | couleur      |           |    |  |  |  |  |  |  |
| 4 |              |           |    |  |  |  |  |  |  |
| 5 |              |           |    |  |  |  |  |  |  |

D 6 4-4-64a (7)



Année : 1965

Emplacement ..... Désignation ..... *Pinet gris productif 91*

|   |              | DATES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | Nombre total |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | 27.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3            | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5            | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4            | 2 x   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4            | 3 x   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ø de 27,365 x -1*

Année : 1966

Emplacement ..... Désignation ..... *Pinet noir productif n° 91*

|   |              | DATES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | Nombre total |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | 21.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4            | 2 ✓   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4            | 2 ✓   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3            | 2 ✓   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ø de 21.3 - 1966 + 9*



Désignation : Pinot noir productif 91

Clos 10 Planche 11 Côte S Rang 1 Souche (1) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU RAUT.

- étolées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à lisère carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Remmes 5-63



N° ordre

Désignation : *Pinet noir productif 91*

Clos *10* Planche *11* côté *5* rang *1* souche *I* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7.)*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7.)*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(I)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9.)*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Résumé 5.63*



Nº ordre

Désignation : Pinot noir productif 31

Clos 10 Planche 11 Côté SA Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

Ventre colore 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 *la base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6-64



N° ordre

Désignation *Pind noir productif 91*

Clos *10* Planche *110* Côté *S* rang *1* souche I *2* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté *5*.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté *3*.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée *3*  
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétioilaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge *3*  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *1* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Garnicaud 8/63*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

10 Planche

11 côté

S

N° 1

souche 1

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 8 cm

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 16/14

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. lat

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 1 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.



Dénomination .... Pinet. mai... productif... 91 .....  
Planche ..... côté 10... 1151 rang ..... souche ①-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen ②, court (3).  
: grêle (1), fort (2). moyen -  
: ramifié ①, peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.
- Section transversale : circulaire (1), elliptique ②, aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée ②, non pruinée (3).  
: glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement ①, partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 10. cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé ⑦, autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds ④.  
: plus foncé ⑥, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis ③.  
: marron ①, brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit ①, large (2).  
: saillant (1), effacé ②.  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant ④.

Calvo 11. 64



N° d'ordre : 0 193-77

Désignation : Pinot noir reproductif 91

Origine :

Emplacement : 10-11 31

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3. 8  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Damergue 70



# Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015

Observateur :

CodeVar : 193 CodeIntro : 193Mtp77

Nom Var : Pinot noir

Emplacement : Vass2R06s126-130

## PHENOLOGIE

| Code    | Descripteur                                   | 1            | 3         | 5       | 7           | 9            |
|---------|---|--------------|-----------|---------|-------------|--------------|
| Oiv 301 | époque du bourgeonnement                      | très précoce | précoce   | Moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 302 | époque de floraison                           | très précoce | précoce   | Moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 303 | époque de véraison                            | très précoce | précoce   | Moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 304 | maturité physiologique de la baie             | très précoce | précoce   | Moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 305 | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce   | Moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 306 | coloration des feuilles en automne            | Jaune        | Rougeâtre | Rouge   | Rouge foncé | rouge violet |

## VIGUEUR ET CROISSANCE

|         |   |                        |        |         |       |            |
|---------|---|------------------------|--------|---------|-------|------------|
| Oiv 351 | vigueur rameaux (floraison)                               | très faible.           | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 352 | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | absent ou très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |

## RESISTANCE

|         |  |  |                       |         |  |                       |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| Oiv 459 | Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe |  | très faible ou faible | moyenne |  | élevée ou très élevée |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1       | 5                   | 24/3          | 29/3                          | 3                      |                             |
| 2       | 6                   | 24/3          | 29/3                          | 10                     |                             |
| 3       | 7                   | 20/3          | 27/3                          | 5                      |                             |
| 4       | 6                   |               | 24/3                          | 8                      |                             |
| 5       | 4                   |               | 31/3                          | 3                      |                             |
| Moyenne | 28                  |               | 28/3                          | 29                     | 10                          |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 15/5       | 19/5-5                     |                              | 13/07         | 23/07 +1                  | 14/08 9                    |                           |

## SUIVI DE MATURETE

| Dates            | 10/8  | 17/08        |  |  |
|------------------|-------|--------------|--|--|
| IR               | 18,5° | 22,2<br>21,6 |  |  |
| Valeur papier PH |       |              |  |  |

Remarque : proche maturité  
17/08. lég. sur maturité

13/07 1G entier vérais qui flétoie.  
16/07 77 baies vérais s2  
20/07 114 vérais.  
23/07 s5 (+ avancée) + préso.



# Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014

Observateur : B. Genna

Code cépage : Pinot N

Code introduction : 77

Nom introduction :

Emplacement : 2 RG 5A26. 130

## PHENOLOGIE

| Code    | Descripteur                                   | 1            | 3         | 5       | 7           | 9            |
|---------|---|--------------|-----------|---------|-------------|--------------|
| Oiv 301 | époque du bourgeonnement                      | très précoce | précoce   | moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 302 | époque de floraison                           | très précoce | précoce   | moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 303 | époque de véraison                            | très précoce | précoce   | moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 304 | maturité physiologique de la baie             | très précoce | précoce   | moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 305 | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce   | Moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 306 | coloration des feuilles en automne            | jaune        | rougeâtre | rouge   | rouge foncé | rouge violet |

## VIGUEUR ET CROISSANCE

|         |   |                        |        |         |       |            |
|---------|---|------------------------|--------|---------|-------|------------|
| Oiv 351 | vigueur rameaux (floraison)                               | très faible.           | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 352 | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | absent ou très faible. | faible | moyenne | forte | très forte |

## RESISTANCE

|         |  |  |                       |         |  |                       |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| Oiv 459 | Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe |  | très faible ou faible | moyenne |  | élevée ou très élevée |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de débourrement |                  | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
|         |                     | début                | moitié (oiv 301) |                        |                             |
| 1       |                     |                      |                  |                        |                             |
| 2       |                     |                      |                  |                        |                             |
| 3       |                     |                      |                  |                        |                             |
| 4       |                     |                      |                  |                        |                             |
| 5       |                     |                      |                  |                        |                             |
| Moyenne |                     | 16/03                | 19/03 +2         |                        |                             |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de véraison |                  | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
|            |                            |                              | début            | moitié (oiv 303) |                            |                           |
| 09/05      | 12/05 -9                   |                              | 16/07            | 20/07 0          | 22/08 /14 -1               |                           |

## SUIVI DE MATURETE

| Dates            | 11/08 | 18/08 | 25/08 |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| IR               | 19°   | 20°   | 22°   |  |  |  |  |  |  |
| Valeur papier PH |       |       |       |  |  |  |  |  |  |

Remarque :



# Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013

Observateur :

CodeVar : 193 CodeIntro : 193Mtp77

Nom Var : Pinot noir

Emplacement : Vass2R06s126-130

## PHENOLOGIE

| Code    | Descripteur                                   | 1            | 3         | 5       | 7           | 9            |
|---------|---|--------------|-----------|---------|-------------|--------------|
| Oiv 301 | époque du bourgeonnement                      | très précoce | précoce   | Moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 302 | époque de floraison                           | très précoce | précoce   | Moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 303 | époque de véraison                            | très précoce | précoce   | Moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 304 | maturité physiologique de la baie             | très précoce | précoce   | Moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 305 | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce   | Moyenne | tardive     | très tardive |
| Oiv 306 | coloration des feuilles en automne            | Jaune        | Rougeâtre | Rouge   | Rouge foncé | rouge violet |

## VIGUEUR ET CROISSANCE

|         |   |                        |        |         |       |            |
|---------|---|------------------------|--------|---------|-------|------------|
| Oiv 351 | vigueur rameaux (floraison)                               | très faible.           | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 352 | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | absent ou très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |

## RESISTANCE

|         |  |  |                       |         |  |                       |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| Oiv 459 | Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe |  | très faible ou faible | moyenne |  | élevée ou très élevée |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1       | 8                   |               | 21/3                          | 9                      |                             |
| 2       | 7                   |               | 21/3                          | 7                      |                             |
| 3       | 7                   |               | 21/3                          | 6                      |                             |
| 4       | 5                   |               | 21/3                          | 4                      |                             |
| 5       | 6                   |               | 22/3                          | 8                      |                             |
| Moyenne | 33                  |               | 21/3 -3                       | 36                     | 10                          |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 24.05.13   | 30.05                      |                              | 31/07         | 06/08                     | 30.08 OK                   |                           |

## SUIVI DE MATURITE

|                  |       |               |  |  |
|------------------|-------|---------------|--|--|
| Dates            | 30.08 | 06.09         |  |  |
| IR               | 21,5  | 23            |  |  |
| Valeur papier PH |       | ↓<br>beaucoup |  |  |

Remarque :



# Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012

Observateur :

Code introduction : 193Mtp77

Nom introduction : Pinot noir

Emplacement : Vass2R06s126-130

## PHENOLOGIE

| Code    | Descripteur                                   | 1            | 3             | 5           | 7           | 9            |
|---------|---|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Oiv 301 | époque du bourgeonnement                      | très précoce | précoce       | Moyenn<br>e | tardive     | très tardive |
| Oiv 302 | époque de floraison                           | très précoce | précoce       | Moyenn<br>e | tardive     | très tardive |
| Oiv 303 | époque de véraison                            | très précoce | précoce       | Moyenn<br>e | tardive     | très tardive |
| Oiv 304 | maturité physiologique de la baie             | très précoce | précoce       | Moyenn<br>e | tardive     | très tardive |
| Oiv 305 | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce       | Moyenn<br>e | tardive     | très tardive |
| Oiv 306 | coloration des feuilles en automne            | Jaune        | Rougeâtr<br>e | Rouge       | Rouge foncé | rouge violet |

## VIGUEUR ET CROISSANCE

|         |   |                        |        |         |       |            |
|---------|---|------------------------|--------|---------|-------|------------|
| Oiv 351 | vigueur rameaux (floraison)                               | très faible.           | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 352 | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | Absent ou très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |

## RESISTANCE

|         |  |  |                       |         |  |                       |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| Oiv 459 | Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe |  | très faible ou faible | moyenne |  | élevée ou très élevée |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) 4/25 | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1       | 11                  |               | 16/3                          | 11                          |                             |
| 2       | 8                   |               | 19/3                          | 8                           |                             |
| 3       | 7                   |               | 26/3                          | 3                           |                             |
| 4       | 7                   |               | 23/3                          | 6                           |                             |
| 5       | 9                   |               | 24/3                          | 4                           |                             |
| Moyenne | 42                  |               | 22/3 -6                       | 32                          | 8                           |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 15.05      | 24.05 -5                   |                              | 12/07         | 26.07 0                   | 29.08                      |                           |

Tout début fls 23.05. Proche RF. moy. moyen.

## SUIVI DE MATURITE

+2

| Dates            | 16.08            | 20.08.                           |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| IR               | 19,5 - 20 - 20,5 | 21,6 - 20,2 - 19 - 20,2 15       |  |  |  |  |  |
| Valeur papier PH |                  | encore un peu Acide. Proche 6,7. |  |  |  |  |  |

Remarque: pas enrou HVA 18.07, mi 20.07

20.07 pas 4 filets = ce qui est vére et déjà mangé par les oiseaux  
26.07 se fait manger par les oiseaux.



**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011

Observateur :

Cépage : Pinot noir

Code introduction : 193Mtp77

Nom introduction : Pinot noir productif 91

Emplacement : Vass2R06s126-130

**PHENOLOGIE**

| Code    | Descripteur                                   | 1            | 3             | 5           | 7           | 9            |
|---------|---|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Oiv 301 | époque du bourgeonnement                      | très précoce | précoce       | Moyenn<br>e | tardive     | très tardive |
| Oiv 302 | époque de floraison                           | très précoce | précoce       | Moyenn<br>e | tardive     | très tardive |
| Oiv 303 | époque de véraison                            | très précoce | précoce       | Moyenn<br>e | tardive     | très tardive |
| Oiv 304 | maturité physiologique de la baie             | très précoce | précoce       | Moyenn<br>e | tardive     | très tardive |
| Oiv 305 | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce       | Moyenn<br>e | tardive     | très tardive |
| Oiv 306 | coloration des feuilles en automne            | Jaune        | Rougeâtr<br>e | Rouge       | Rouge foncé | rouge violet |

**VIGUEUR ET CROISSANCE**

|         |   |                        |        |         |       |            |
|---------|---|------------------------|--------|---------|-------|------------|
| Oiv 351 | vigueur rameaux (floraison)                               | très faible.           | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 352 | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | Absent ou très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |

**RESISTANCE**

|         |  |  |                       |         |  |                       |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| Oiv 459 | Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe |  | très faible ou faible | moyenne |  | élevée ou très élevée |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1       | 12                  | 10/3          | 17/3                          | 7                      |                             |
| 2       | 9                   |               | 17/3                          | 6                      |                             |
| 3       | 9                   |               | 18/3                          | 10                     |                             |
| 4       | 4                   | 10/3          | 17/3                          | 4                      |                             |
| 5       | 11                  |               | 20/3                          | 11                     |                             |
| Moyenne | 45                  |               | 18/3 +1                       | 38                     | 8                           |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 06.05.11   | 11.05.11                   | -3                           | 10.07         | 20.07 +1                  | 18.08.11                   |                           |

proche de 0.05-11

**SUIVI DE MATURITE**

| Dates            |             |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| IR               | 21,2 - 21,8 |  |  |  |  |  |  |
| Valeur papier PH | 8,5 A       |  |  |  |  |  |  |

Remarque : 11.06.11 RAS Véraison + le 20.06 - rien le 06.07 - 12.07 = D.V. b. commença



**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010      Observateur :  
Code cépage : 193      Code introduction : 77  
Nom introduction : Pinot N      Emplacement : Vass2R06s126-130

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1       | 8                   | 3 déb le 23/3 | 25/3                          | 8                      |                             |
| 2       | 7                   |               | 23/3                          | 9                      |                             |
| 3       | 7                   |               | 23/3                          | 6                      |                             |
| 4       | 4                   |               | 23/3                          | 4                      |                             |
| 5       | 6                   | 23/3          | 25/3                          | 10                     |                             |
| Moyenne | 32                  |               | 24/3 - 5                      | 37                     | 12                          |

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début DV | véraison moitié MV (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 23/05         | 25/05                      |                              | 12/07            | 26/07                        | 20/08                      |                           |

-8

9/07 = 1er en DV

+1

-1



T

**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : **2009** Observateur :  
Code cépage : 193 Code introduction : 77  
Nom introduction : Pinot N Emplacement : **Vass2R06s126-130**

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1       | 5                   | 16/3          | 23/3                          | 0                      |                             |
| 2       | 8                   | 12/3          | 19/3                          | 0                      |                             |
| 3       | 8                   | 12/3          | 19/3                          | 0                      |                             |
| 4       | 5                   | 12/3          | 18/3                          | 0                      |                             |
| 5       | 5                   | 16/3          | 19/3                          | 0                      |                             |
| Moyenne |                     |               | 20/3 +3                       | 0                      | Pas représentatif           |

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|               |                            |                              |               |                           |                            |                           |



**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année :2008 Phéno Observateur :  
CodeIntro : 193Mtp77 NomVar : **Pinot noir**  
Nom introduction : Pinot noir productif 91 Emplacement : **Vass2R06s126-130**

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
  
oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

*Vassal :*

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de début        | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1       | 9                   | 3/3                  | 11/3                          | 14                     |                             |
| 2       | 8                   | 3/3 <sub>3 d/b</sub> | 11/3                          | 7                      |                             |
| 3       | 8                   | 3/3                  | 11/3                          | 8                      |                             |
| 4       | 7                   | 3/3                  | 11/3                          | 12                     |                             |
| 5       | 7                   | 3/3                  | 11/3                          | 13                     |                             |
| Moyenne | 39                  |                      | 11/3                          | 54                     | 14                          |

+ 1

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 15/5          | 19/5                       |                              | 14/04         | 24/04                     | 13/08                      |                           |

- 5

V 0

0

DF produ 13/5



(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 77

Emplacement : 02R06S126.130



**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2006

Observateur :

Code cépage : 0193

Code introduction : 77

Nom introduction : Pinot N

Emplacement : 02R06S126.130

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de début   | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1       | 7                   | 23/3            | 27/3                          | 6                      |                             |
| 2       | 9                   | 23/3            | 27/3                          | 5                      |                             |
| 3       | 6                   | 23/3            | 27/3                          | 12                     |                             |
| 4       | 3                   | 25/3            | 30/3                          | 0                      |                             |
| 5       | 5                   | big Gouffé 23/3 | 27/3                          | 6                      |                             |
| Moyenne | 30                  |                 | 28/3                          | 29                     | 10                          |

+1

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 18/5          | 24/5                       |                              | 17/7          | 24/7 +1                   | 16/8 +1                    |                           |

Par en voie NF le 22/5 -2

enclou A - m si ERB - 20 6/1/8



**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : **2005**

Observateur :

Code cépage : 193    Code introduction : 77

Nom introduction : Pinot N

Emplacement : 02R06S126.130

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1       | 8                   | 30/3          | 01/04                         | 12                     |                             |
| 2       | 7                   | 30/3          | 01/04                         | 14                     |                             |
| 3       | 6                   | 01/04         | 05/04                         | 7                      |                             |
| 4       | 3                   | 30/3          | 01/04                         | 2                      |                             |
| 5       | 8                   | 30/3          | 01/04                         | 11                     |                             |
| Moyenne | 32                  |               | 214                           | 46                     | 14                          |

0/

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 24/5          | 23/5                       |                              |               | 30/07                     | 23/08                      |                           |

-2

Pami la 25/07  
Bois durs  
même  
Vérifier

0

11-12 %



T

## Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004

Observateur :

Code cépage : 193

Code introduction : 77

Nom introduction : Pinot N

Emplacement : 2 R 6 A 126-130

## Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

## Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1       | 6                   |               | 25/03                         | 3                      |                             |
| 2       | 4                   |               | 25/03                         | 1                      |                             |
| 3       | 5                   |               | 23/03                         | 10                     |                             |
| 4       | 3                   |               | 25/03                         | 0                      |                             |
| 5       | 3                   |               | 23/03                         | 6                      |                             |
| Moyenne | 21                  |               | 24.3.04/                      | 20                     |                             |

+3

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 25/05         | 2/6                        |                              | 21/07         | 28/7                      | 19/8                       |                           |

-1

0

-1



T

**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003      Observateur :  
Code cépage : 193      Code clone : 77  
Nom cépage : Pinot N      Emplacement : 286A 126-130

Phénologie

- oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
- oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

- oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1       | 4                   | 25.3          | 28.3                          | 8                      |                             |
| 2       | 4                   | 25.3          | 28.3                          | 5                      |                             |
| 3       | 3                   | 25.3          | 28.3                          | 4                      |                             |
| 4       | 5                   | 25.3          | 28.3                          | 12                     |                             |
| 5       | 4                   | 25.3          | 28.3                          | 3                      |                             |
| Moyenne | 20                  |               | 28.3.03                       | 32                     | 16                          |

+4

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 305) | Coloration Feuilles (oiv306) |
|------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 23/05                      |                              | 18/7          | 22/7                      | 12-8                       |                           |                              |

-4

+4

0//



Témoign

**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002

Observateur

Code cépage : 0193

Code clone : 77

Nom cépage : Pinot N

Emplacement : 2 R 6 A. 126. 130

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. *Botrytis* grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

| Souche  | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappe/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1       | 4                   | 8-3           | 11-3                          | 0                      | 0                          |
| 2       | 4                   | 8-3           | 13-3                          | 6                      | 15                         |
| 3       | 4                   | 8-3           | 11-3                          | 1                      | 3                          |
| 4       | 3                   | 8-3           | 11-3                          | 3                      | 10                         |
| 5       | 3                   | 15-3          | 18-3                          | 5                      | 17                         |
| Moyenne | 18                  |               | 13.3.02                       | 15                     | 9                          |

- 1

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | fin   | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date début | de moitié (oiv 303) | véraison fin | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|-------|------------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
|            | 23/05                      | 24/05 |                              | 15-7       | 22/7                | 6/8          | 20/8                       |                           |

- 2

+ 2

0